


化学療法（パクリタキセル + ベバシズマブ）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	()クール目
身長 ()cm	Cr ()	()mg/dL
体重 ()kg	パクリタキセル投与量 (90mg/m ²) : ()	()mg/body
体表面積 ()m ²	アバシチン投与量 (10mg/kg) : ()	()mg/body

レジメ	1日目・15日目	8日目
	内服 ① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 メインルート(PVCフリー・フィルター付き) ① 上記内服と同時に開始 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 ガスター(20mg) 1本 点滴 30分 ② パクリタキセル ()mg 生理食塩液(250mL) 1本 点滴 約1時間 ③ アバシチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間半 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です </div> ④ ソルデム3A(500mL) 1本 点滴 2時間	内服 ① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 メインルート(PVCフリー・フィルター付き) ① 上記内服と同時に開始 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 ガスター(20mg) 1本 点滴 30分 ② パクリタキセル ()mg 生理食塩液(250mL) 1本 点滴 約1時間 ③ ソルデム3A(500mL) 1V 点滴 2時間半



パクリタキセルは1日目、8日目および15日目
 ベバシズマブは1日目および15日目

 4週間で1クール
 以上を可能な限り繰り返す