

## 化学療法 (アフリベルセプト + FOLFIRI)

ID ( )	患者名 ( )	( ) 回目
生年月日 ( )	ザルトラップ投与量 (4mg/kg) :	( )mg/body
身長 ( )cm	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体重 ( )kg	5-FU (持続) 投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	イリノテカン投与量 (150mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
	5-FU (静注) 投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body

1 日 目	<b>メインルート</b>	<b>内服</b>
	① グラニセロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本  点滴 1時間	① イメドカプセルセット 1日目
	② ザルトラップ ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本  点滴 1時間	
	③ レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本  点滴 2時間	<b>側管</b> ③ イリノテカン ( )mg 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本  点滴 2時間
④ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本  点滴 46時間	④ 5-FU ( )mg 生理食塩液 (50mL) 1本  点滴 5分以内	
2 日 目	5-FU継続	<b>内服</b> ⑤ イメドカプセルセット 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 4錠
3 日 目	⑦ 生理食塩液 (50mL) 1本	⑥ イメドカプセルセット 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 4錠
	終了	



2週間

2週に1回投薬  
 以上を可能な限り繰り返す