


## 化学療法（アフリベルセプト + sLV5FU2）

ID ( )	患者名 ( )	( )回目
生年月日 ( )		
身長 ( )cm	ザルトラップ投与量 (4mg/kg) :	( )mg/body
体重 ( )kg	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body

<b>1 日 目</b>	<b>メインルート</b> ① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 30分  ② ザルトラップ ( )mg 生理食塩液(100mL) 1本  点滴 1時間  ③ レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本  点滴 2時間  ④ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 46時間	④ 5-FU ( )mg 生理食塩液(50mL) 1本  点滴 5分以内	
<b>2 日 目</b>	5-FU継続		
<b>3 日 目</b>	⑤ 生理食塩液(50mL) 1本  終了		