


化学療法（ペバシズマブ + FOLFIRI）

ID ()	患者名 ()	()	回目
生年月日 ()	アバスチン投与量 (5mg/kg) : ()		mg/body
身長 ()cm	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) : ()		mg/body
体重 ()kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) : ()		mg/body
体表面積 ()m ²	イリノテカン投与量 (150mg/m ²) : ()		mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) : ()		mg/body

1 日 目	メインルート	内服
	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間	イメンドカプセルセット 1日目
	② アバスチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間半	
	③ レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間	③ イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間
④ 5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間	④ 5-FU ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 5分以内	
2 日 目	5-FU継続	内服 ⑤ イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
	3 日 目	⑦ 生理食塩液(50mL) 1本
終了		