


化学療法（ペバシズマブ + SOX）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	アバスチン投与量 (7.5mg/kg) : ()	mg/body
体重 ()kg	オキサリプラチン投与量 (130mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	エスワン1日投与量 (80mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ	メインルート	内服
	①	
	グラニセトンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本	イメンドカプセルセット 1日目
	点滴 1時間	
	②	
	アバスチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 1時間半	
	外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です	
	③	
	オキサリプラチン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本	
	点滴 2時間	
	④	
	生理食塩液(50mL) 1本	
		
	ペバシズマブおよびオキサリプラチンは1日目のみ S-1内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は点滴日より3日間 デカドロン内服は点滴翌日より2日間 以上3週間で1クール	
	内服	
	エスワン配合OD錠 ()	朝 0錠 夕 0錠
	(1日目の夕方より15日目の朝まで)	
	内服	
	イメンドカプセルセット デカドロン錠(0.5mg)	午前中 朝 4錠 昼 4錠
	(点滴翌日より2日間)	