

化学療法（ベバシズマブ + XELIRI）

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	アバスチン投与量 (7.5mg/kg) : ()mg/body
体重 ()kg	イリノテカン投与量 (150mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) : ()mg/body

レジメ	メインルート	内服
	① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間	イメンドカプセルセット 1日目
	② アバスチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間半	
	外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です	
	③ イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 1時間半	
	④ 生理食塩液(50mL) 1本	
		点滴 ↓ 2週間内服 → 1週間休薬
	内服 ゼローダ錠(300) 朝 0錠 夕 0錠 (1日目の夕方より15日目の朝まで)	ベバシズマブおよびイリノテカンは1日目のみ カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は点滴日より3日間 デカドロン内服は点滴翌日より2日間 以上3週間で1クール
	内服 イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠 (点滴翌日より2日間)	