

## 化学療法（ペバシズマブ + XELOX）

ID ( )	患者名 ( )
生年月日 ( )	年齢 ( )
身長 ( )cm	アバスチン投与量 (7.5mg/kg) : ( )mg/body
体重 ( )kg	オキサリプラチン投与量 (130mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body

レジメ	メインルート	内服
	<b>①</b> グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 1時間	イメンドカプセルセット 1日目
	<b>②</b> アバスチン ( )mg 生理食塩液(100mL) 1本  点滴 1時間半	
	外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です	
	<b>③</b> オキサリプラチン ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 2時間	
	<b>④</b> 生理食塩液(50mL) 1本	
	<b>内服</b> ゼローダ錠(300) 朝 0錠 夕 0錠  (1日目の夕方より15日目の朝まで)	
	<b>内服</b> イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠  (点滴翌日より2日間)	
	ベバシズマブおよびオキサリプラチンは1日目のみ カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は点滴日より3日間 デカドロン内服は点滴翌日より2日間  以上3週間で1クール	