

化学療法（ペバシズマブ + sLV5FU2）

| | | |
|------------------------|--|------------|
| ID () | 患者名 () | ()回目 |
| 生年月日 () | 年齢 | |
| 身長 ()cm | アバスチン投与量 (5mg/kg) : | ()mg/body |
| 体重 ()kg | レボホリナート投与量 (200mg/m ²) : | ()mg/body |
| 体表面積 ()m ² | 5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) : | ()mg/body |
| | 5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) : | ()mg/body |

| | | |
|-------------|--|--|
| 1 日 目 | メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 | 投薬 ↓ 2週間 ↓ 2週に1回投薬 2回施行後、継続判断 |
| | ② アバスチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間半 | |
| | ③ レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間 | |
| | ④ 5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間 | |
| | 側管 ④ 5-FU ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 5分以内 | |
| 2 日 目 | 5-FU継続 | |
| 3 日 目 | ⑤ 生理食塩液(50mL) 1本 終了 | |