

### 化学療法（セツキシマブ + mFOLFOX6）

ID ( )	患者名 ( )	( )	回目
生年月日 ( )	アービタックス投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
身長 ( )cm	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体重 ( )kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	オキサリプラチン投与量 (85mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body

1 日 目	<b>メインルート</b>		<b>内服</b>	
	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分		① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 イメンドカプセルセット 1日目	
	② 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 約 15分			
	③ アービタックス ( )mg 生理食塩液(500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間			
	④ 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 1時間		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 2週に1回投薬                  以上を可能な限り繰り返す             </div>	
	⑤ レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間			
⑥ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間		<b>側管</b>		
		⑤ オキサリプラチン ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間		
		⑥ 5-FU ( )mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 5分以内		
2 日 目	5-FU継続		<b>内服</b>	
		⑦ イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠		
3 日 目	⑨ 生理食塩液(50mL) 1本		⑧ イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠	
		終了		