


化学療法（セツキシマブ + sLV5FU2）

ID ()	患者名 ()	()	回目
生年月日 ()	年齢		
身長 ()cm	アービタックス投与量 (400mg/m ²) : ()		mg/body
体重 ()kg	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) : ()		mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) : ()		mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) : ()		mg/body

1 日 目	メインルート	内服
	① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分	① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服
	② 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 約 15分	
	③ アービタックス ()mg 生理食塩液(500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間	
	④ 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 1時間	
	⑤ レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間	
	側管	
⑥ 5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間	⑥ 5-FU ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 5分以内	
2 日 目	5-FU継続	
3 日 目	⑦ 生理食塩液(50mL) 1本 フラッシュ用 終了	