

### 化学療法 (FOLFIRI)

ID ( )	患者名 ( )	( ) 回目
生年月日 ( )	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
身長 ( )cm	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体重 ( )kg	イリノテカン投与量 (150mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	5-FU(静注)投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body

レジメ

1 日 目	<b>メインルート</b> ① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間	<b>内服</b> イメンドカプセルセット 1日目
	② レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間	<b>側管</b> ② イリノテカン ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間
	③ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1V 点滴 46時間	③ 5-FU ( )mg 生理食塩液(50mL) 1V 点滴 5分以内
2 日 目	5-FU継続	<b>内服</b> ④ イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
3 日 目	⑥ 生理食塩液(50mL) 1本	⑤ イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
終了		

