

化学療法 (FOLFOXIRI)

ID ()	患者名 ()	()	回目
生年月日 ()		Cr ()	mg/dL
身長 ()cm	イリノテカン投与量 (150mg/m ²)	:	()mg/body
体重 ()kg	レボホリナート投与量 (200mg/m ²)	:	()mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²)	:	()mg/body
	オキサリプラチン投与量 (85mg/m ²)	:	()mg/body

1 日 目	メインルート	内服
	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間	イメドカプセルセット 1日目
	② イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 2時間	
	③ レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間	側管 ③ オキサリプラチン ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間
④ 5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間		
2 日 目	5-FU継続	内服 ⑤ イメドカプセルセット 2日目 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
3 日 目	⑦ 生理食塩液(50mL) 1本	⑥ イメドカプセルセット 3日目 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
	終了	