


化学療法 (パニツムマブ + イリノテカン)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	ベクティビックス投与量 (6mg/kg) : ()	mg/body
体重 ()kg	イリノテカン投与量 (150mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		

レジメ	メインルート	内服
	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分	① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 イメンドカプセルセット 1日目
	② 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 約 15分	
	③ ベクティビックス ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間	
	④ 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 30分	
	⑤ イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 1時間半	
	⑥ 生理食塩液(50mL) 1本	
	内服 イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠 (点滴翌日より2日間)	



パニツムマブおよびイリノテカンはDay 1のみ
 イメンド内服は点滴日より3日間
 デカドロン内服は点滴翌日より2日間

 以上2週間で1クール