

### 化学療法 (パニツムマブ + FOLFIRI)

ID ( )	患者名 ( )	( ) 回目
生年月日 ( )	ベクティビックス投与量 (6mg/kg) :	( )mg/body
身長 ( )cm	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体重 ( )kg	5-FU (持続) 投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	イリノテカン投与量 (150mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
	5-FU (静注) 投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body

1 日 目	<b>メインルート</b>	<b>内服</b>
	① グラニセロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本  点滴 30分	① レスタミン錠 (10mg) 5錠 内服 イメドカプセルセット 1日目
	② 生理食塩液 (50mL) 1本  点滴 約 15分	
	③ ベクティビックス ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本  点滴 1時間	
	④ 生理食塩液 (50mL) 1本  点滴 30分	
		<b>側管</b>
⑤ レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本  点滴 2時間	⑤ イリノテカン ( )mg 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本  点滴 2時間	
⑥ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本  点滴 46時間	⑥ 5-FU ( )mg 生理食塩液 (50mL) 1本  点滴 5分以内	
2 日 目	5-FU継続	<b>内服</b> ⑦ イメドカプセルセット 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 4錠
3 日 目	⑨ 生理食塩液 (50mL) 1本	⑧ イメドカプセルセット 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 4錠
	終了	