

## 化学療法（パニツムマブ + IRIS）

ID ( )	患者名 ( )	
生年月日 ( )	年齢 ( )	クール目 ( )
身長 ( )cm	ベクティビックス投与量 (6mg/kg) : ( )	mg/body
体重 ( )kg	イリノテカン投与量 (150mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	エスワン1日投与量 (80mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body

レジメ	メインルート	内服
	① グラニセトンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 30分	① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 イメンドカプセルセット 1日目
	② 生理食塩液(50mL) 1本  点滴 約 15分	
	③ ベクティビックス ( )mg 生理食塩液(100mL) 1本  点滴 1時間	
	④ 生理食塩液(50mL) 1本  点滴 30分	
	⑤ イリノテカン ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 1時間半	
	⑥ 生理食塩液(50mL) 1本	

パニツムマブおよびイリノテカンは1日目のみ  
 S-1内服は1日目の夕から8日目の朝まで  
 1週間投薬、1週間休薬  
 イメンド内服は点滴日より3日間  
 デカドロン内服は点滴翌日より2日間

以上2週間で1クール

**内服**  
 エスワン配合OD錠( ) 朝 0錠  
 夕 0錠

(1日目の夕方より8日目の朝まで)

**内服**  
 イメンドカプセルセット 午前中  
 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠  
 昼 4錠

(点滴翌日より2日間)