

化学療法 (パニツムマブ + mFOLFOX6)

ID ()	患者名 ()	() 回目
生年月日 ()	ベクティビックス投与量 (6mg/kg) :	()mg/body
身長 ()cm	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) :	()mg/body
体重 ()kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²	オキサリプラチン投与量 (85mg/m ²) :	()mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) :	()mg/body

1 日 目	メインルート	内服
	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分	① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 イメンドカプセルセット 1日目
	② 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 約 15分	
	③ ベクティビックス ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間	
	④ 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 30分	
	⑤ レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間	側管 ⑤ オキサリプラチン ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間
⑥ 5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間	⑥ 5-FU ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 5分以内	
2 日 目	5-FU継続	内服 ⑦ イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
3 日 目	⑨ 生理食塩液(50mL) 1本	⑧ イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
	終了	