


化学療法 (ラムシルマブ + FOLFIRI)

ID ()	患者名 ()	() 回目
生年月日 ()	サイラムザ投与量 (8mg/kg) :	()mg/body
身長 ()cm	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) :	()mg/body
体重 ()kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²	イリノテカン投与量 (150mg/m ²) :	()mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) :	()mg/body

1 日 目	メインルート ① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間	内服 ① レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 イメドカプセルセット 1日目
	② サイラムザ ()mg 生理食塩液(250mL) 1本 点滴 1時間	
	③ 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 1時間	
	側管 ④ レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間	④ イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間
	⑤ 5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間	⑤ 5-FU ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 5分以内
2 日 目	5-FU継続	内服 ⑥ イメドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
3 日 目	⑧ 生理食塩液(50mL) 1本	⑦ イメドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
	終了	