

## 化学療法 (mFOLFOX6)

ID ( )	患者名 ( )	( )	回目
生年月日 ( )	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
身長 ( )cm	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体重 ( )kg	オキサリプラチン投与量 (85mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	5-FU(静注)投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body

### レジメ

	メインルート	内服	
1 日 目	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 1時間		イメドカプセルセット 1日目
	② レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本  点滴 2時間	② オキサリプラチン ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本  点滴 2時間	
	③ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 46時間	③ 5-FU ( )mg 生理食塩液(50mL) 1本  点滴 5分以内	
2 日 目	5-FU継続	④ イメドカプセルセット デカドロン錠(0.5mg) デカドロン錠(0.5mg)	午前中 朝 4錠 昼 4錠
3 日 目	⑥ 生理食塩液(50mL) 1本	⑤ イメドカプセルセット デカドロン錠(0.5mg) デカドロン錠(0.5mg)	午前中 朝 4錠 昼 4錠
	終了		

