

化学療法（ベバシズマブ + SOX）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目
身長 ()cm	アバシチン投与量 (7.5mg/kg) : ()	mg/body
体重 ()kg	オキサリプラチン投与量 (130mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	エスワン1日投与量 (80mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

メインルート

内服

①

生理食塩液 (100mL) 1本
 アロキシ (0.75mg) 1本
 デカドロン (8mg) 1本

イメンドカプセルセット 1日目

点滴 1時間

②

アバシチン () mg
 生理食塩液 (100mL) 1本

点滴 1時間半

外来治療においては
 2クール目以降は1時間でも可能です

③

オキサリプラチン () mg
 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本

点滴 2時間

④

生理食塩液 (50mL) 1本

点滴

2週間内服

1週間休薬

内服

エスワン配合OD錠 () 朝 0錠
 タ 0錠

(1日目の夕方より15日目の朝まで)

内服

イメンドカプセルセット 午前中

(点滴翌日より2日間)

ベバシズマブおよびオキサリプラチンは1日目のみ
 S-1内服は1日目の夕から15日目の朝まで
 2週間投薬、1週間休薬
 イメンド内服は点滴日より3日間

以上3週間で1クール