

化学療法（ペバシズマブ + XELIRI）

| | | |
|------------------------|--|---------|
| ID () | 患者名 () | |
| 生年月日 () | 年齢 () | クール目 |
| 身長 ()cm | アバスチン投与量 (7.5mg/kg) : () | mg/body |
| 体重 ()kg | イリノテカン投与量 (150mg/m ²) : () | mg/body |
| 体表面積 ()m ² | ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) : () | mg/body |

| レジメ | メインルート | 内服 |
|-----|---|-----------------|
| | ① | |
| | 生理食塩液(100mL) 1本 | イメンドカプセルセット 1日目 |
| | アロキシ(0.75mg) 1本 | |
| | デカドロン(8mg) 1本 | |
| | 点滴 1時間 | |
| | ② | |
| | アバスチン ()mg | |
| | 生理食塩液(100mL) 1本 | |
| | 点滴 1時間半 | |
| | 外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です | |
| | ③ | |
| | イリノテカン ()mg | |
| | 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 | |
| | 点滴 1時間半 | |
| | ④ | |
| | 生理食塩液(50mL) 1本 | |
| | | |
| | ペバシズマブおよびイリノテカンは1日目のみ カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は点滴日より3日間 以上3週間で1クール | |
| | 内服 | |
| | ゼローダ錠(300) | 朝 0錠 夕 0錠 |
| | (1日目の夕方より15日目の朝まで) | |
| | 内服 | |
| | イメンドカプセルセット | 午前中 |
| | (点滴翌日より2日間) | |