

化学療法（ペバシズマブ + XELOX）

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	アバスチン投与量 (7.5mg/kg) : ()mg/body
体重 ()kg	オキサリプラチン投与量 (130mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) : ()mg/body

レジメ	メインルート	内服
	①	
	生理食塩液(100mL) 1本	イメンドカプセルセット 1日目
	アロキシ(0.75mg) 1本	
	デカドロン(8mg) 1本	
	点滴 1時間	
	②	
	アバスチン ()mg	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 1時間半	
	外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です	
	③	
	オキサリプラチン ()mg	
	5%ブドウ糖液(500mL) 1本	
	点滴 2時間	
	④	
	生理食塩液(50mL) 1本	
	↓ 点滴 ↓ 2週間内服 → 1週間休薬	
	ペバシズマブおよびオキサリプラチンは1日目のみ カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は点滴日より3日間 以上3週間で1クール	
	内服	
	ゼローダ錠(300)	朝 0錠 夕 0錠
	(1日目の夕方より15日目の朝まで)	
	内服	
	イメンドカプセルセット	午前中
	(点滴翌日より1日間)	