

化学療法 (パニツムマブ + イリノテカン)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	ベクティビックス投与量 (6mg/kg) : ()	mg/body
体重 ()kg	イリノテカン投与量 (150mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		

レジメ	メインルート	内服
イン ラ イ ン フ ィ ル タ ー を 使 用 す る こ と	① グラニセトロンバッグ(100mL) 1V デカドロン(8mg) 1V 点滴静注 200mL/hr	① レスタミン錠(10mg) 5T イメンド(125mg) 1C
	② 生理食塩液(50mL) 1V フラッシュ用 (0.5V以上で途中終了可)	
	③ ベクティビックス ()mg 生理食塩液(100mL) 1V 点滴静注 100mL/hr	
	④ 生理食塩液(50mL) 1V 点滴静注 100mL/hr	
	⑤ イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1V 点滴静注 340mL/hr	
	⑥ 生理食塩液(50mL) 1V フラッシュ用	
	内服 イメンド(80mg) 1C 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4T 昼 4T (点滴翌日より2日間)	

点滴 ↓
 2週間 →

パニツムマブおよびイリノテカンはDay 1のみ
 イメンド内服は点滴日より3日間
 デカドロン内服は点滴翌日より2日間

以上2週間で1クール