

## 化学療法 (XELIRI)

ID ( )	患者名 ( )	
生年月日 ( )	年齢 ( )	クール目 ( )
身長 ( )cm	イリノテカン投与量 (150mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体重 ( )kg	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		

レジメ	メインルート	内服
	① 生理食塩液(100mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 1時間	イメンドカプセルセット 1日目
	② イリノテカン ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 1時間半	<p>点滴 ↓                  2週間内服 → 1週間休薬</p>
	③ 生理食塩液(50mL) 1本	
	<b>内服</b> ゼローダ錠(300) 朝 0錠 夕 0錠  (1日目の夕方より15日目の朝まで)	
	<b>内服</b> イメンドカプセルセット 午前中  (点滴翌日より2日間)	イリノテカンは1日目のみ カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は点滴日より3日間  以上3週間で1クール