

化学療法（ドキソルビシン + シスプラチン）

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	Cr ()mg/dL
体重 ()kg	ドキソルビシン投与量 (60mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	シスプラチン投与量 (50mg/m ²) : ()mg/body

レジメ

1日目	2日目	3日目
① ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 50分	内服 イメンドカプセルセット 2日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠	内服 イメンドカプセルセット 3日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠
② 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本 アロキシ (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 1時間	① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
内服 ②開始時 イメンドカプセルセット 1日目	② ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	② ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
③ ドキソルビシン ()mg 生理食塩液 (50mL) 1本 点滴 15分	③ 飲水・飲食できれば省略可 ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間	③ 飲水・飲食できれば省略可 ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間
④ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半	終了後へパリンロック、または抜針	終了後抜針
⑤ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間	投薬 3～4週間 3～4週に1回投薬 合計6クール施行	
⑥⑦ ヴィーンF (500mL) 2本 マンニトール 200mL 点滴 2本で4時間 終了後へパリンロック、または抜針		