

化学療法 (BEP : プレオマイシン + エトポシド + シスプラチン)

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()	年齢	Cr ()	mg/dL
身長 ()cm		プレオ投与量 (30mg/body) :	()mg/body
体重 ()kg		ラステット投与量 (100mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²		シスプラチン投与量 (20mg/m ²) :	()mg/body

レジメ	1日目	2日目 ~ 5日目
	① ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 1時間	内服 イメンドカプセルセット 午前中 (2日目と3日目のみ)
	② グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分	① ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 1時間
	③ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 1時間半	② グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分
	内服 ③開始時 イメンドカプセルセット 1日目	③ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 1時間半
	④ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 約 2時間	④ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 約 2時間
	⑤ ヴィーンF (500mL) 1本 点滴 1時間半	⑤ ヴィーンF (500mL) 1本 点滴 1時間半
	⑥ ラステット ()mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本 点滴 2時間	⑥ ラステット ()mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本 点滴 2時間
	⑦ 生理食塩液 (50mL) 1本 点滴 15分	⑦ ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
	⑧ プレオ ()mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分	⑧ ヘパロックシリンジ 1本 (2日目~4日目)
	⑨ ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	
	⑩ ヘパロックシリンジ 1本	


エトポシドとシスプラチンは1日目から5日目まで
 プレオマイシンは1日目、8日目および15日目

 以上3週間で1クール
 合計3~4クール施行

化学療法（BEP：ブレオマイシン + エトポシド + シスプラチン）

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()	年齢	Cr ()	mg/dL
身長 ()cm		ブレオ投与量 (30mg/body) :	()mg/body
体重 ()kg		ラステット投与量 (100mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²		シスプラチン投与量 (20mg/m ²) :	()mg/body

レジメ	8日目	15日目
	<p>①</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本</p> <p style="padding-left: 40px;">点滴 30分</p>	<p>①</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本</p> <p style="padding-left: 40px;">点滴 30分</p>
	<p>②</p> <p>ブレオ ()mg</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本</p> <p style="padding-left: 40px;">点滴 30分</p>	<p>②</p> <p>ブレオ ()mg</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本</p> <p style="padding-left: 40px;">点滴 30分</p>
	<p>③</p> <p>生理食塩液(50mL) 1本</p> <p style="padding-left: 40px;">点滴 15分</p>	<p>③</p> <p>生理食塩液(50mL) 1本</p> <p style="padding-left: 40px;">点滴 15分</p>



エトポシドとシスプラチンは1日目から5日目まで
ブレオマイシンは1日目、8日目および15日目

以上3週間で1クール
合計3~4クール施行