


## 化学療法（Dose-dense TC + ベバシズマブ）

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )	年齢	Cr ( )	mg/dL
身長 ( )cm	パクリタキセル投与量 (80mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body
体重 ( )kg	カルボプラチン投与量 (AUC:5) : ( )		mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	アバステン投与量 (15mg/kg) : ( )		mg/body

レジメ	1日目	8日目・15日目
	<p><b>内服</b></p> <p>① レスタミン錠 (10mg) 5錠 内服</p> <p><b>メインルート(PVCフリー・フィルター付き)</b></p> <p>① 上記内服と同時に開始</p> <p>グラニセトンバッグ (100mL) 1本                      デカドロン (8mg) 2本                      ガスター (20mg) 1本</p> <p>点滴 30分</p> <p>②</p> <p>パクリタキセル ( )mg                      ソルデム3A (200mL) 1本</p> <p>点滴 1時間</p> <p>③</p> <p>カルボプラチン ( )mg                      5%ブドウ糖液 (500mL) 1本</p> <p>点滴 約 2時間</p> <p>④</p> <p>アバステン ( )mg                      生理食塩液 (100mL) 1V</p> <p>点滴 1時間半</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                         外来治療においては                          2クール目以降は1時間でも可能です                     </div> <p>⑤</p> <p>5%ブドウ糖液 (250mL) 1V</p> <p>点滴 1時間</p>	<p><b>内服</b></p> <p>① レスタミン錠 (10mg) 5錠 内服</p> <p><b>メインルート(PVCフリー・フィルター付き)</b></p> <p>① 上記内服と同時に開始</p> <p>グラニセトンバッグ (100mL) 1本                      デカドロン (8mg) 2本                      ガスター (20mg) 1本</p> <p>点滴 30分</p> <p>②</p> <p>パクリタキセル ( )mg                      ソルデム3A (200mL) 1本</p> <p>点滴 1時間</p> <p>③</p> <p>ソルデム3A (500mL) 1本</p> <p>点滴 2時間半</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>Day 1 PTX CBDCA BV 投薬                          Day 8 PTX 投薬                          Day 15 PTX 投薬</p> <p>1週間 1週間 1~2週間</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                         パクリタキセルは1日目、8日目および15日目                          カルボプラチンおよびベバシズマブは1日目のみ                          以上3~4週間で1クール、合計6~9クール施行                     </div>