


化学療法（ゲムシタピン + ベバシズマブ）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm		
体重 ()kg	ゲムシタピン投与量 (1000mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	アバスチン投与量 (15mg/kg) : ()	mg/body

レジメ	Day 1	Day 8
	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分
	② ゲムシタピン ()mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本 点滴 30分	② ゲムシタピン ()mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本 点滴 30分
	③ アバスチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間半	③ 生理食塩液(50mL) 1本
	外来治療においては 2クール目以降は1時間でも可能です	
	④ 生理食塩液(50mL) 1本	
		 <p style="text-align: center;"> 投薬 Day 1 GEM BV 投薬 Day 8 GEM 1週間 → 1週間 → 1週間 </p>
		ゲムシタピンは2週投薬、1週休薬 ベバシズマブはDay 1のみ 3週間で1クール、可能な限り繰り返す