


## 化学療法（ゲムシタビン + カルボプラチン）

ID ( )	患者名 ( )		
生年月日 ( )	年齢 ( )		クール目 ( )
身長 ( )cm		24hCcr ( )	mL/min
体重 ( )kg		ゲムシタビン投与量 (1000mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		カルボプラチン投与量 (AUC:4) : ( )	mg/body

レジメ	Day 1	Day 8
	<b>メインルート</b> ① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 30分  ② ゲムシタビン ( )mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本  点滴 30分  ③ カルボプラチン ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 約 2時間  ④ 生理食塩液(50mL) 1本  <b>内服</b> デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠  (点滴翌日より2日間)	<b>メインルート</b> ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 30分  ② ゲムシタビン ( )mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本  点滴 30分  ③ 生理食塩液(50mL) 1V
		 <p style="text-align: center;">                         投薬 Day 1 GEM CBDCA      投薬 Day 8 GEM                          1週間      2週間                     </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">                         ゲムシタビンは1日目および8日目                          カルボプラチンは1日目のみ                          デカドロン内服は2日目および3日間                           以上3週間で1クール                          合計3～6クール施行                     </div>