


化学療法（ゲムシタビン + ドセタキセル）

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		クール目 ()
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		ゲムシタビン投与量 (900mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		ドセタキセル投与量 (70mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ	1日目	8日目
	<p>メインルート</p> <p>①</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>②</p> <p>ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>③</p> <p>生理食塩液(50mL) 1本</p>	<p>内服</p> <p>①</p> <p>ナゼアOD錠(0.1mg) 1錠</p> <p>メインルート</p> <p>① 上記内服と同時に開始</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>②</p> <p>ドセタキセル ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間15分</p> <p>③</p> <p>ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>④</p> <p>ソルデム3A(200mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間</p> <p>内服</p> <p>デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠</p> <p style="text-align: right;">(点滴翌日より2日間)</p>
	 <p>Day 1 GEM Day 8 GEM DTX</p> <p>投薬 ↓ 投薬 ↓</p> <p>1週間 → 1週間 → 1~2週間 →</p>	
	<p>ゲムシタビンは1日目および8日目 ドセタキセルは8日目のみ</p> <p>以上3~4週間で1クール、合計4~8クール施行</p>	