

化学療法 (イホスファミド + シスプラチン)

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()	年齢	Cr ()	mg/dL
身長 ()cm		シスプラチン投与量 (20mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg		イホマイド投与量 (1200mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		ウロミテキサン1回投与量 (400mg/body) : (400)	mg/body

レジメ

メインルート

①
 ソルデム1 (500mL) 1本
 硫酸Mg (20mL) 0.5本
 点滴 2時間

内服
 イメンドカプセルセット
 1日目は開始1時間半後
 2~3日目は午前中

②
 グラニセトロンバッグ (100mL) 1本
 デカドロン (8mg) 1本
 点滴 30分

1週 (5日間) 投薬、2~3週休薬
 3~4週間で1クール

③
 シスプラチン ()mg
 生理食塩液 (500mL) 1本
 点滴 約 2時間

④
 イホマイド ()mg
 ウロミテキサン (400)mg
 生理食塩液 (500mL) 1本
 点滴 約 2時間

⑤
 ソルデム3A (500mL) 1本
 点滴 2時間半

側管

①
 ウロミテキサン (400)mg
 生理食塩液 (20mL) 1本
 イホマイド開始4時間後 注射

⑥
 ソルデム3A (500mL) 1本
 点滴 ウロミテキサン終了まで

↓

②
 ウロミテキサン (400)mg
 生理食塩液 (20mL) 1本
 イホマイド開始8時間後 注射

終了