

## 化学療法（ノギテカン + シスプラチン）

ID ( )	患者名 ( )		
生年月日 ( )	年齢 ( )		クール目 ( )
身長 ( )cm		Cr ( )	mg/dL
体重 ( )kg		ハイカムチン投与量 (0.75mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		シスプラチン投与量 (50mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body

### レジメ

1日目	2日目	3日目
① ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本  点滴 約 50分	内服 イメンドカプセルセット 2日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠	内服 イメンドカプセルセット 3日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠
② 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本 アロキシ (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本  点滴 1時間	① ソルアセトD (500mL) 1本  点滴 2時間	① ソルアセトD (500mL) 1本  点滴 2時間
内服 ②開始時 イメンドカプセルセット 1日目	② ハイカムチン mg 生理食塩液 (100mL) 1本  点滴 30分	② ハイカムチン mg 生理食塩液 (100mL) 1本  点滴 30分
③ ハイカムチン mg 生理食塩液 (100mL) 1本  点滴 30分	③ ソルアセトD (500mL) 1本  点滴 2時間	③ ソルアセトD (500mL) 1本  点滴 2時間
④ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL  点滴 1時間半	④ ソルデム3A (500mL) 1本  点滴 2時間	④ ソルデム3A (500mL) 1本  点滴 2時間
⑤ シスプラチン mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用  点滴 2時間		
⑥⑦ ヴィーンF (500mL) 2本 マンニトール 200mL  点滴 2本で4時間	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     ノギテカンは3日間連続投与                      シスプラチンは1日目のみ                      3~4週間で1クール、合計6クール実施                 </div>	
終了後ヘパリンロック	終了後ヘパリンロック	終了後抜針