

化学療法（ペムプロリズマブ + DC）

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	キイトルーダ投与量 (200mg/body) : ()mg/body
体重 ()kg	ドセタキセル投与量 (60mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	カルボプラチン投与量 (AUC:5) : ()mg/body

レジメ

メインルート(PVCフリー・フィルター付き)

①

生理食塩液(100mL) 1V

点滴 30分

②

キイトルーダ ()mg

生理食塩液(100mL) 1V

点滴 30分

③

生理食塩液(50mL) 1V

点滴 約 15分

内服

④

グラニセロンバッグ(100mL) 1本	アプレピタントカプセルセット 1日目
デカドロン(8mg) 1本	

点滴 1時間

⑤

ドセタキセル ()mg

生理食塩液(250mL) 1本

点滴 1時間

⑥

カルボプラチン ()mg

5%ブドウ糖液(500mL) 1本

点滴 約 2時間

⑦

生理食塩液(50mL) 1本

↓ 投薬

→ 3~4週間

3~4週に1回投薬
 合計3~6クール施行

内服

アプレピタントカプセル	午前中
デカドロン錠(0.5mg)	朝 4錠
	昼 4錠

(点滴翌日より2日間)