



化学療法（JLSG-02 Maintenance B）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	ドキシルビシン投与量 (35mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	オンコピン投与量 (0.05mg/kg) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	メソトレキセート投与量 (3mg/kg) : ()	mg/body
	エンドキサン投与量 (10mg/kg) : ()	mg/body
	プレドニゾロン投与量 (2mg/kg/day) : ()	mg/day


レジメ	Day 1	<p>メインルート</p> <p>① 生理食塩液(100mL) 1V</p> <p>ルートキープ</p> <div style="text-align: center;">  <p>終了</p> </div> <p>側管</p> <p>① オンダンセトロン(2mg) 1A うち 指示量</p> <p>静注</p> <p>② ドキシルビシン ()mg 生理食塩液(20mL) 内 mL</p> <p>静注</p> <p>③ オンコピン ()mg 生理食塩液(20mL) 内 mL</p> <p>静注</p> <p>処方箋</p> <p>プレドニゾロン mg 3×朝昼夕 / 5日分</p>
------------	--------------	---




8週間で1クール
合計3クール施行

化学療法 (JLSG-02 Maintenance B)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	ドキシルビシン投与量 (35mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	オンコピン投与量 (0.05mg/kg) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	メソトレキセート投与量 (3mg/kg) : ()	mg/body
	エンドキサン投与量 (10mg/kg) : ()	mg/body
	プレドニゾロン投与量 (2mg/kg/day) : ()	mg/day


レジメ	Day 15	<p>メインルート</p> <p>① 生理食塩液(100mL) 1V</p> <p>ルートキープ</p> <div style="text-align: center;">  <p>終了</p> </div> <p>側管</p> <p>① オンダンセトロン(2mg) 1A うち 指示量</p> <p>静注</p> <p>② メソトレキセート ()mg 生理食塩液(20mL) 内 mL</p> <p>点滴静注 mL/hr</p> <p>処方箋</p> <p>プレドニゾロン mg 3×朝昼夕 / 3日分</p>
------------	---------------	--




8週間で1クール
合計3クール施行

化学療法（JLSG-02 Maintenance B）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	ドキシルビシン投与量 (35mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	オンコピン投与量 (0.05mg/kg) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	メソトレキセート投与量 (3mg/kg) : ()	mg/body
	エンドキサン投与量 (10mg/kg) : ()	mg/body
	プレドニゾロン投与量 (2mg/kg/day) : ()	mg/day


Day 29	レジメ	<p>メインルート</p> <p>① 生理食塩液(100mL) 1V</p> <p>ルートキープ</p> <div style="text-align: center;">  <p>終了</p> </div> <p>側管</p> <p>① オンダンセトロン(2mg) 1A うち 指示量</p> <p>静注</p> <p>② エンドキサン ()mg 生理食塩液(20mL) 内 mL</p> <p>点滴静注 60mL/hr</p> <p>③ オンコピン ()mg 生理食塩液(20mL) 内 mL</p> <p>静注</p> <p>処方箋</p> <p>プレドニゾロン mg 3×朝昼夕 / 5日分</p>
---------------	------------	--




8週間で1クール
合計3クール施行

化学療法（JLSG-02 Maintenance B）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	ドキシルビシン投与量 (35mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	オンコピン投与量 (0.05mg/kg) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	メソトレキセート投与量 (3mg/kg) : ()	mg/body
	エンドキサン投与量 (10mg/kg) : ()	mg/body
	プレドニゾロン投与量 (2mg/kg/day) : ()	mg/day

レジメ	Day 43	<p>メインルート</p> <p>① </p> <p>生理食塩液(100mL) 1V</p> <p>ルートキープ</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>終了</p> </div> <p>側管</p> <p>① </p> <p>オンダンセトロン(2mg) 1A うち 指示量</p> <p>静注</p> <p>② </p> <p>メソトレキセート ()mg</p> <p>生理食塩液(20mL) 内 mL</p> <p>点滴静注 mL/hr</p> <p>処方箋</p> <p>プレドニゾロン mg 3×朝昼夕 / 3日分</p>
------------	---------------	---



8週間で1クール
合計3クール施行