

## 化学療法（ゲムシタピン + カルボプラチン）

ID ( )	患者名 ( )		
生年月日 ( )	年齢 ( )		クール目 ( )
身長 ( )cm		24hCcr ( )	mL/min
体重 ( )kg		ゲムシタピン投与量 (1000mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		カルボプラチン投与量 (AUC:5) : ( )	mg/body

レジメ	Day 1	Day 8
	<p><b>内服</b></p> <p>イメンド(125mg) 1C</p> <p><b>メインルート</b></p> <p>① イメンド内服後、以下開始</p> <p>グラニセトンバッグ(100mL) 1V                      デカドロン(8mg) 1V</p> <p>点滴静注 100mL/hr</p> <p>②</p> <p>ゲムシタピン ( )mg                      5%ブドウ糖液(100mL) 1V</p> <p>点滴静注 200mL/hr</p> <p>③</p> <p>カルボプラチン ( )mg                      生理食塩液(500mL) 1V</p> <p>点滴静注 300mL/hr</p> <p>④</p> <p>生理食塩液(50mL) 1V</p> <p>フラッシュ用</p> <p><b>内服</b></p> <p>イメンド(80mg) 1C 午前中                      デカドロン錠(0.5mg) 朝 4T                      昼 4T</p> <p style="text-align: center;">(Day 2 および Day 3)</p>	<p><b>メインルート</b></p> <p>①</p> <p>生理食塩液(100mL) 1V                      デカドロン(8mg) 1V</p> <p>点滴静注 200mL/hr</p> <p>②</p> <p>ゲムシタピン ( )mg                      5%ブドウ糖液(100mL) 1V</p> <p>点滴静注 200mL/hr</p> <p>③</p> <p>生理食塩液(50mL) 1V</p> <p>フラッシュ用</p>
		<p style="text-align: center;">                     Day 1 投薬 GEM CBDCA                      Day 8 投薬 GEM                      1週間 2週間                 </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ゲムシタピンはDay 1およびDay 8                      カルボプラチンはDay 1のみ                      イメンド内服はDay 1より3日間                      デカドロン内服はDay 2より2日間</p> <p>以上3週間で1クール</p> </div>