

## 化学療法（ゲムシタピン + シスプラチン）

ID ( )	患者名 ( )	
生年月日 ( )	年齢 ( )	( ) クール目
身長 ( )cm		Cr ( )mg/dL
体重 ( )kg	ゲムシタピン投与量 (1000mg/m <sup>2</sup> ): ( )	( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	シスプラチン投与量 (70mg/m <sup>2</sup> ): ( )	( )mg/body

### レジメ

Day 1	Day 2	Day 3
<p>①</p> <p>ソルデム1 (200mL) 1V                      硫酸Mg (20mL) 0.5A</p> <p>点滴静注 250mL/hr</p>	<p>内服</p> <p>イメンド(80mg) 1C 午前中                      デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8T                      デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8T</p>	<p>内服</p> <p>イメンド(80mg) 1C 午前中                      デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8T                      デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8T</p>
<p>②</p> <p>5%ブドウ糖液 (250mL) 1V                      アロキン (0.75mg) 1V                      デカドロン (8mg) 1V                      デカドロン (2mg) 2A</p> <p>点滴静注 250mL/hr</p>	<p>①</p> <p>ソルアセトD (500mL) 1V</p> <p>自然滴下 2時間</p>	<p>①</p> <p>ソルアセトD (500mL) 1V</p> <p>自然滴下 2時間</p>
<p>内服 ②開始時</p> <p>イメンド(125mg) 1C</p>	<p>②</p> <p>ソルアセトD (500mL) 1V</p> <p>自然滴下 2時間</p>	<p>②</p> <p>ソルアセトD (500mL) 1V</p> <p>自然滴下 2時間</p>
<p>③</p> <p>ゲムシタピン ( )mg                      5%ブドウ糖液 (100mL) 1V</p> <p>点滴静注 200mL/hr</p>	<p>③ 飲水・飲食できれば省略可</p> <p>ソルデム3A (500mL) 1V</p> <p>自然滴下 2時間</p> <p style="text-align: center;">終了後へパロック、または抜針</p>	<p>③ 飲水・飲食できれば省略可</p> <p>ソルデム3A (500mL) 1V</p> <p>自然滴下 2時間</p> <p style="text-align: center;">終了後抜針</p>
<p>④</p> <p>ソルデム3A (500mL) 1V                      マンニトール 100mL</p> <p>点滴静注 400mL/hr</p>		
<p>⑤</p> <p>シスプラチン ( )mg                      生理食塩液 (500mL) 1V                      合計600mLにして使用</p> <p>点滴静注 300mL/hr</p>		
<p>⑥⑦</p> <p>ヴィーンF (500mL) 1V ) × 2                      マンニトール 100mL</p> <p>点滴静注 300mL/hr</p> <p style="text-align: center;">終了後へパロック、または抜針</p>		

