

化学療法 (M-VAC)

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()	メソトレキセート投与量 (30mg/m ²) : ()		mg/body
身長 ()cm	エクザール投与量 (3mg/m ²) : ()		mg/body
体重 ()kg	ドキソルビシン投与量 (30mg/m ²) : ()		mg/body
体表面積 ()m ²	シスプラチン投与量 (70mg/m ²) : ()		mg/body

レジメ

	1日目	2日目	3日目	15日目	22日目
	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分	メインルート ① ソルデム1(200mL) 1本 硫酸Mg(20mL) 0.5本 点滴 約 50分	内服 ① イメンドカプセルセット 2日目 午前中	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分
	② メソトレキセート ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 30分	② 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間	メインルート ① ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間	② メソトレキセート ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 30分	② メソトレキセート ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 30分
	③ ソルデム1(500mL) 1本 メイロン(20mL) 1本 点滴 2時間	内服 ②開始時 イメンドカプセルセット 1日目	② ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間	③ エクザール ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 6分	③ エクザール ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 6分
	④ ソルデム1(500mL) 1本 メイロン(20mL) 1本 点滴 2時間 終了後へパロック	③ エクザール ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 6分	③ 飲水・飲食できれば省略可 ソルデム3A(500mL) 1本 点滴 2時間	③ ソルデム1(500mL) 1本 メイロン(20mL) 1本 点滴 2時間	③ ソルデム1(500mL) 1本 メイロン(20mL) 1本 点滴 2時間
		④ ドキシソルビシン ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 15分	4日目		
		⑤ ソルデム3A(500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半	内服 ① イメンドカプセルセット 3日目 午前中		
		⑥ シスプラチン ()mg 生理食塩液(500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間			
		⑦⑧ ヴィーンF(500mL) 2本 マンニトール 200mL 点滴 2本で4時間 終了後へパロック			

