

化学療法（TIP：パクリタキセル＋イホスファミド＋シスプラチン）

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()	パクリタキセル投与量 ($175\text{mg}/\text{m}^2$) :	()	mg/body
身長 ()cm	シスプラチン投与量 ($25\text{mg}/\text{m}^2$) :	()	mg/body
体重 ()kg	イホマイド投与量 ($1200\text{mg}/\text{m}^2$) :	()	mg/body
体表面積 () m^2	ウロミテキサン1回投与量 ($400\text{mg}/\text{body}$) :	(400)	mg/body

1日目	レジメ	メインルート(PVCフリー・フィルター付き)	内服
		①	①
		グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 2本 ガスター(20mg) 1本	レスタミン錠(10mg) 5錠 内服
		点滴 30分	
		②	
		パクリタキセル ()mg 生理食塩液(500mL) 1本	
		点滴 約 3時間	
		③	
		ソルアセトD(500mL) 1本	
		点滴 2時間	
		④	
		ヘパロックスリンジ 1本	
1週(4日間)投薬、2～3週休薬 3～4週間で1クール			

化学療法（TIP：パクリタキセル＋イホスファミド＋シスプラチン）

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()	パクリタキセル投与量 (175mg/m ²) : ()mg/body		
身長 ()cm	シスプラチン投与量 (25mg/m ²) : ()mg/body		
体重 ()kg	イホマイド投与量 (1200mg/m ²) : ()mg/body		
体表面積 ()m ²	ウロミテキサン1回投与量 (400mg/body) : (400)mg/body		

レジメ 2日目～4日目	メインルート ① ソルデム1(500mL)1本 硫酸Mg(20mL)0.5本 点滴 約 2時間	内服 イメンドカプセルセット
	② グラニセトロンバッグ(100mL)1本 デカドロン(8mg)1本 点滴 30分	2日目は開始1時間半後 3～4日目は午前中
	③ シスプラチン ()mg 生理食塩液(500mL)1本 点滴 約 2時間	1週(4日間)投薬、2～3週休薬 3～4週間で1クール
	④ イホマイド ()mg ウロミテキサン (400)mg 生理食塩液(500mL)1本 点滴 約 2時間	
	⑤ ソルデム3A(500mL)1本 点滴 2時間半	側管 ①' ウロミテキサン (400)mg 生理食塩液(20mL)1本
	⑥ ソルデム3A(500mL)1本 点滴 ウロミテキサン終了まで	イホマイド開始4時間後 注射
	↓ 終了	②' ウロミテキサン (400)mg 生理食塩液(20mL)1本 イホマイド開始8時間後 注射