

化学療法（ダカルバジン）

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	Cr ()mg/dL
体重 ()kg	ダカルバジン投与量 (250mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	

レジメ	1日目	2日目 ~ 5日目
	メインルート ① 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本 点滴 3時間 内服 イメンドカプセル(125mg) 1個 側管 ① イメンド内服と同時に開始 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 デカドロン(2mg) 2本 点滴 1時間 ② ダカルバジン ()mg 注射用水 (20mL) 2本 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 点滴 約 45分 終了後ヘパリンロック、または抜針	メインルート ① 5%ブドウ糖液 (500mL) 1V 点滴静注 3時間 内服 イメンドカプセル(80mg) 1個 午前中 (2日目と3日目のみ) 側管 ① 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 ② ダカルバジン ()mg 注射用水 (20mL) 2本 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 点滴 約 45分 終了後ヘパリンロック、または抜針



1週(5日間)投薬、3週休薬
 4週間で1クール
 以上を可能な限り繰り返す