

化学療法（イリノテカン + シスプラチン）

| | | | |
|------------------------|---------|--|---------|
| ID () | 患者名 () | | |
| 生年月日 () | 年齢 () | () | クール目 |
| 身長 ()cm | | Cr () | mg/dL |
| 体重 ()kg | | イリノテカン投与量 (60mg/m ²) : () | mg/body |
| 体表面積 ()m ² | | シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : () | mg/body |

レジメ

| 1日目 | 2日目 | 3日目 |
|--|---|---|
| 内服 | 内服 | 内服 |
| イメンドカプセルセット 1日目 | イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 8錠 | イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 8錠 |
| ① イメンド内服後、以下開始 | ① | ① |
| ソルデム1(200mL) 1本 硫酸Mg(20mL) 0.5本 点滴 40分 | ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間 | ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間 |
| ② | ② | ② |
| 5%ブドウ糖液(100mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 デカドロン(2mg) 2本 点滴 20分 | ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間 | ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間 |
| ③ | ③ 飲水・飲食できれば省略可 | ③ 飲水・飲食できれば省略可 |
| イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 1時間半 | ソルデム3A(500mL) 1本 点滴 2時間 終了後へパロック、または抜針 | ソルデム3A(500mL) 1本 点滴 2時間 終了後抜針 |
| ④ | | |
| ソルデム3A(500mL) 1V マンニトール 100mL 点滴 1時間半 | | |
| ⑤ | | |
| シスプラチン ()mg 生理食塩液(500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間 | | |
| ⑥⑦ | | |
| ヴィーンF(500mL) 2本 マンニトール 200mL 点滴 2本で4時間 終了後へパロック、または抜針 | | |

化学療法（イリノテカン + シスプラチン）

| | | | |
|------------------------|---------|--|------------|
| ID () | 患者名 () | | |
| 生年月日 () | 年齢 () | | ()クール目 |
| 身長 ()cm | | Cr () | ()mg/dL |
| 体重 ()kg | | イリノテカン投与量 (60mg/m ²) : () | ()mg/body |
| 体表面積 ()m ² | | シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : () | ()mg/body |

レジメ

| 8日目 | 15日目 |
|--|--|
| <p>メインルート</p> <p>① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>② イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間半</p> <p>③ 生理食塩液(50mL) 1本</p> | <p>メインルート</p> <p>① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1V</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>② イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間半</p> <p>③ 生理食塩液(50mL) 1本</p> |

