

化学療法（ペムトレキセド + カルボプラチン + ベバスチマブ）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	アリムタ投与量 (500mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	カルボプラチン投与量 (AUC=5) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	アバスチン投与量 (15mg/kg) : ()	mg/body

レジメ

メインルート

①
 グラニセトロンバッグ(100mL) 1本
 デカドロン(8mg) 1本

点滴 30分

②
 アリムタ ()mg
 生理食塩液(100mL) 1本

点滴 12分

③
 生理食塩液(100mL) 1本

点滴 30分

④
 カルボプラチン ()mg
 5%ブドウ糖液(250mL) 1本

点滴 約 2時間

⑤
 アバスチン ()mg
 生理食塩液(100mL) 1本

点滴 約 1時間半 → 2クール目以降は約 1時間でも可能です

⑥
 生理食塩液(100mL) 1本

点滴 30分

内服

デキサメサゾン(0.5) 朝 4錠
 昼 4錠

(点滴翌日より2日間)

↓ 投薬

3週間

3週に1回投薬
合計4~6クール施行

※ ビタミンB₁₂を9週間ごとに筋肉内注射

※ 葉酸を化学療法の1週間以上前より連日内服