

## 化学療法（ペムトレキセド + カルボプラチン）

|                        |         |                                       |          |
|------------------------|---------|---------------------------------------|----------|
| ID ( )                 | 患者名 ( ) |                                       |          |
| 生年月日 ( )               | 年齢 ( )  |                                       | クール目 ( ) |
| 身長 ( )cm               |         | Cr ( )                                | mg/dL    |
| 体重 ( )kg               |         | アリムタ投与量 (500mg/m <sup>2</sup> ) : ( ) | mg/body  |
| 体表面積 ( )m <sup>2</sup> |         | カルボプラチン投与量 (AUC=5) : ( )              | mg/body  |

**レジメ**

**メインルート**

①

グラニセトロンバッグ(100mL) 1本  
 デカドロン(8mg) 1本

点滴 30分

②

アリムタ ( )mg  
 生理食塩液(100mL) 1本

点滴 12分

③

生理食塩液(100mL) 1本

点滴 30分

④

カルボプラチン ( )mg  
 生理食塩液(250mL) 1本

点滴 約 2時間

⑤


ソルデム3A(200mL) 1本

点滴 1時間

**内服**

デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠  
 昼 4錠

(点滴翌日より2日間)



↓

投薬

3週間

3週に1回投薬  
合計4~6クール施行

※ ビタミンB<sub>12</sub>を9週間ごとに筋肉内注射

※ 葉酸を化学療法の1週間以上前より連日内服