


化学療法（ペムトレキセド + シスプラチン）

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		()クール目
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		アリムタ投与量 (500mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		シスプラチン投与量 (75mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

1日目	2日目	3日目
① ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 50分	内服 イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠	内服 イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠
② 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本 アロキシ (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 1時間	① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
③ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半	② ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	② ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
内服 ③開始時 イメンドカプセルセット 1日目	③ ③ ③ ③ ③ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間	③ ③ ③ ③ ③ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間
④ アリムタ ()mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 12分	終了後へパロック、または抜針	
⑤ 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分	<div style="text-align: center;">  </div>	
⑥ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間		
⑦⑧ ヴィーンF (500mL) 2本 マンニトール 200mL 点滴 2本で約 5時間 終了後へパリンロック、または抜針		

※ ビタミンB₁₂を9週間ごとに筋肉内注射
 ※ 葉酸を化学療法の1週間以上前より連日内服