

化学療法 (S-1 + シスプラチン + RT併用)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm		Cr ()mg/dL
体重 ()kg		シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²		エスワン1日投与量 (80mg/m ²) : ()mg/body

レジメ

1日目	2日目	3日目
①		
ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 50分	内服 イメンドカプセルセット 2日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠	内服 イメンドカプセルセット 3日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠
②		
5%ブドウ糖液 (250mL) 1本 アロキシ (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 1時間	① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
③		
ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半	② ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	② ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
③ ③ ③		
③ ③ ③ 内服 ③開始時 イメンドカプセルセット 1日目	③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間	③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間
※ エスワン配合OD錠の飲み方 1日目の夕方から開始して15日目の朝まで 朝 0錠 夕 0錠		
④		
シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間	点滴 ↓ 2週間内服 → 1週間休薬	
⑤		
ヴィーンF (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 2時間	シスプラチンは1日目のみ S-1内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 デカドロン内服は点滴翌日より2日間 以上3週間で1クール 2クール施行後、地固め化学療法を検討	
⑥		
ヴィーンF (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 2時間	完了後	
完了後ヘパリンロック、または抜針		