


化学療法（イトポシド + シスプラチン ± RT併用）

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()	()	クール目
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		イトポシド投与量 (80mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		シスプラチン投与量 (70mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

1日目	2日目	3日目
内服 イメンドカプセルセット 1日目 ① イメンド内服後、以下開始 ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 40分 ② 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 アロキシ (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 20分 ③ イトポシド mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本 点滴 2時間 ④ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半 ⑤ シスプラチン mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間 ⑥⑦ ヴィーンF (500mL) 2本 マンニトール 200mL 点滴 2本で4時間 終了後ヘパリンロック	内服 イメンドカプセルセット 2日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠 ① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間 ② イトポシド mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本 点滴 2時間 ③ ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間 ④ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間 終了後ヘパリンロック	内服 イメンドカプセルセット 3日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 8錠 ① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間 ② イトポシド mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本 点滴 2時間 ③ ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間 ④ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間 終了後抜針
 <p> 3日間連続投与 3週以上休薬 放射線治療併用の場合あり </p>		