



化学療法 (S-1 + シスプラチン)

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		クール目 ()
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		エスワン1日投与量 (80mg/m ²) : ()	mg/body

ティーエスワン開始 7日目 (点滴1日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 夕方5時から翌日10時まで	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> エスワン内服は指示された日まで 継続する </div>
8日目 (点滴2日目)	① 10時より 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 非常にゆっくり <div style="text-align: center;">  </div> シスプラチン終了後、速度変更 点滴 約2時間 ⑤ マンニトール (300mL) 1本 点滴 約1時間	① イメンドカプセルセット 1日目 イメンド内服の30分後より以下開始 ② グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン 12mg 点滴 30分 ③ シスプラチン ()mg 合計 生理食塩液 (500mL) 1本 600mL 点滴 2時間 ④ 左記速度変更が続いて ラシックス (20mg) 1本 注射 <div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ccc;">3週間内服</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ccc;">2週間休薬</div> </div> </div>
	⑥⑦⑧⑨⑩⑪ ソルデム3A (500mL) 6本 点滴 翌朝まで	シスプラチンは8日目のみ S-1内服は1日目から21日目まで3週間投薬、2週間休薬 イメンド内服は治療薬点滴日より3日間 デキサメサゾン内服は治療薬点滴翌日より3日間 以上5週間で1クール
9日目 (点滴3日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本 点滴 翌朝まで	① イメンドカプセルセット 2日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 昼 8錠
10日目		① イメンドカプセルセット 3日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 昼 8錠