


### 化学療法（トラスツズマブ + XP）

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )	年齢	Cr ( )	mg/dL
身長 ( )cm	ハーセプチン投与量 (8mg/kg → 6mg/kg) : ( )		mg/body
体重 ( )kg	シスプラチン投与量 (60mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	ゼロータ1日投与量 (2000mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body

治療薬前日 (点滴1日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 夕方5時から翌日10時まで	※ ゼロータ内服は治療薬点滴日の夕方から開始する 1日2回 朝夕 1回 0錠	
	① 10時より 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 非常にゆっくり 	① ハーセプチン ( )mg 生理食塩液 (250mL) 1本 点滴 1時間半	
治療薬点滴 1日目 (点滴2日目)		② 11時 イメンドカプセルセット 1日目	
		③ グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン 12mg 点滴 30分	
		④ シスプラチン ( )mg 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 2時間	合計 600mL
	⑤ 左記速度変更について ラシックス (20mg) 1本 注射		
	⑥ マンニトール (300mL) 1本 点滴 約1時間	↓ 点滴 2週間内服 → 1週間休薬	
	⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ソルデム3A (500mL) 6本 点滴 翌朝まで	トラスツズマブおよびシスプラチンは1日目のみ カペシタピン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は治療薬点滴日より3日間 デキサメサゾン内服は治療薬点滴翌日より3日間 以上3週間で1クール	
2日目 (点滴3日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本 点滴 翌朝まで	① イメンドカプセルセット 2日目 デキサメサゾン (0.5) 朝 8錠 昼 8錠	
3日目		① イメンドカプセルセット 3日目 デキサメサゾン (0.5) 朝 8錠 昼 8錠	