




化学療法 (XP : カペシタピン + シスプラチン)

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		クール目 ()
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) : ()	mg/body

治療薬前日 (点滴1日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 夕方5時から翌日10時まで	※ ゼローダ内服は治療薬点滴日の夕方から開始する 1日2回 朝夕 1回 0錠
治療薬点滴 1日目 (点滴2日目)	① 10時より 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 非常にゆっくり  シスプラチン終了後、速度変更 点滴 約 2時間 ⑤ マンニトール (300mL) 1本 点滴 約 1時間 ⑥⑦⑧⑨⑩⑪ ソルデム3A (500mL) 6本 点滴 翌朝まで	① イメンドカプセルセット 1日目 イメンド内服の30分後より以下開始 ② グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン 12mg 点滴 30分 ③ シスプラチン ()mg 合計 生理食塩液 (500mL) 1本 600mL 点滴 2時間 ④ 左記速度変更が続いて ラシックス (20mg) 1本 注射   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> シスプラチンは1日目のみ カペシタピン内服は1日目の夕から15日目の朝まで 2週間投薬、1週間休薬 イメンド内服は治療薬点滴日より3日間 デキサメサゾン内服は治療薬点滴翌日より3日間 </div>
2日目 (点滴3日目)	①②③④ ヴィーンF (500mL) 4本 点滴 翌朝まで	① イメンドカプセルセット 2日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 昼 8錠
3日目		① イメンドカプセルセット 3日目 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 8錠 昼 8錠