


### 化学療法 (sLV5FU2 + ニボルマブ)

ID ( )	患者名 ( ) ( )	回目
生年月日 ( )	年齢	
身長 ( )cm	オプジーボ投与量 (240mg/body) :	( )mg/body
体重 ( )kg	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )mg/body

1 日 目	メインルート(PVCフリー・フィルター付き)	
	①	
	生理食塩液(100mL)	1本
	デカドロン(8mg)	1本
	点滴	30分
	②	
生理食塩液(50mL)	1本	
点滴	約 15分	
③		
オプジーボ ( )mg		
生理食塩液(100mL)	1本	
点滴	30分	
④		
生理食塩液(50mL)	1本	
点滴	30分	
⑤		
レボホリナート ( )mg		
5%ブドウ糖液(250mL)	1本	
点滴	2時間	
側管		
⑥		
5-FU ( )mg		
5%ブドウ糖液(500mL)	1本	
点滴	46時間	
	⑥	
5-FU ( )mg		
生理食塩液(50mL)	1本	
点滴	5分以内	
2 日 目	5-FU継続	
3 日 目	⑦	
	生理食塩液(50mL)	1本
終了		



2週に1回投薬  
以上を可能な限り繰り返す