


## 化学療法 (XELOX)

ID ( )	患者名 ( )
生年月日 ( )	年齢 ( )
身長 ( )cm	オキサリプラチン投与量 (130mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body
体重 ( )kg	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	

レジメ	メインルート	内服
	<b>①</b> 生理食塩液(100mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 1時間	イメンドカプセルセット 1日目
	<b>②</b> オキサリプラチン ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 2時間	
	<b>③</b> 生理食塩液(50mL) 1本	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         オキサリプラチンは1日目のみ                          カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで                          2週間投薬、1週間休薬                          イメンド内服は点滴日より3日間                           以上3週間で1クール                     </div>
	<b>内服</b> ゼローダ錠(300) 朝 0錠 夕 0錠  (1日目の夕方より15日目の朝まで)	
	<b>内服</b> イメンドカプセルセット 午前中  (点滴翌日より2日間)	