


## 化学療法 (mFOLFIRINOX)

ID ( )	患者名 ( )	( )	回目
生年月日 ( )		Cr ( )	mg/dL
身長 ( )cm	オキサリプラチン投与量 (85mg/m <sup>2</sup> )	:	( )mg/body
体重 ( )kg	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> )	:	( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> )	:	( )mg/body
	イリノテカン投与量 (150mg/m <sup>2</sup> )	:	( )mg/body

<b>1 日 目</b>	<b>メインルート</b>	<b>内服</b>
	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 1時間	イメドカプセルセット 1日目
	② オキサリプラチン ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 2時間	
	③ レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本  点滴 2時間	<b>側管</b> ③ イリノテカン ( )mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本  点滴 2時間
④ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  点滴 46時間		
<b>2 日 目</b>	5-FU継続	<b>内服</b> ⑤ イメドカプセルセット 2日目 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
<b>3 日 目</b>	⑦ 生理食塩液(50mL) 1本	⑥ イメドカプセルセット 3日目 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
	終了	